

Vaccin contre le VPH

Virus du papillome humain

Le **vaccin contre le virus du papillome humain (VPH)** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon qui sont en 6^e année. Il est également offert gratuitement aux personnes âgées de 9 à 26 ans, aux personnes séropositives et aux autres personnes à risque élevé. De plus, il est recommandé pour toutes les femmes âgées de 27 à 45 ans (il n'est toutefois pas offert gratuitement aux personnes de cette tranche d'âge).

Le **vaccin contre le VPH** consiste en une série de deux ou trois doses, selon l'âge.

Le virus du papillome humain peut causer :

- Verrues génitales
- Cancer du col de l'utérus
- Cancers de l'anus, de la bouche et de la gorge, du pénis, du vagin et de la vulve

Complications possibles :

- Cancers invasifs
- Décès

Pourquoi recommande-t-on la vaccination contre le papillome humain?

Le fait de recevoir le vaccin contre le VPH à un jeune âge permet de prévenir les infections avant même d'être à risque. Trois personnes sexuellement actives sur quatre contracteront le VPH à un moment ou à un autre de leur vie. La plupart des personnes infectées ne présentent pas de symptômes et peuvent transmettre le virus à d'autres personnes à leur insu. Le VPH peut se résorber de lui-même, mais chez certaines personnes, il peut devenir cancéreux.

Le vaccin VPH9 protège les filles et les femmes contre les neuf types de VPH à l'origine des cas de verrues génitales et de cancers du col utérin, du vagin, de la vulve, de l'anus et de la gorge. Ce vaccin protège également les garçons et les hommes contre les mêmes types de VPH à l'origine des cas de verrues génitales et de cancers du pénis, de l'anus et de la gorge.

Le vaccin contre le VPH procure une protection efficace, sûre et durable.

Effets secondaires possibles du vaccin :

Il est **possible** qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient avoir de la fièvre ou des maux de tête, ou éprouver de la fatigue ou des problèmes digestifs. Ces symptômes sont généralement légers et ne durent qu'un jour ou deux.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez un professionnel de la santé si les symptômes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave. Ces réactions sont rares et se traitent à la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une réaction allergique grave. Si vous développez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

yukonimmunization.ca/fr

