

Vaccin conjugué contre le méningocoque C

Infections à méningocoque de type C

Le **vaccin conjugué contre le méningocoque C (Men C-C)** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon et protège contre les infections à méningocoque de type C et les complications qui y sont associées.

Le **méningocoque de type C** est une bactérie qui peut causer des infections mortelles, notamment une infection du cerveau ou du sang. Les infections à méningocoque se propagent facilement par la toux, les éternuements ou les contacts avec la salive d'une personne infectée. La bactérie à méningocoque peut être transmise par une personne asymptomatique.

Le **vaccin Men C-C** est administré aux enfants à l'âge de 2 mois, puis à l'âge d'un an. Les enfants ayant des troubles médicaux particuliers pourraient avoir besoin d'une dose supplémentaire à l'âge de 4 mois.

Les infections à méningocoque C peuvent causer :

- Forte fièvre
- Maux de tête sévères
- Nausées et vomissements
- Détérioration générale de l'état de santé
- Éruptions cutanées

Complications possibles :

- Lésions cérébrales permanentes
- Surdit 
- Amputation des mains ou des pieds (10 à 15 %)
- Décès (10 à 15 %)

Pourquoi recommande-t-on la vaccination contre le méningocoque de type C?

Très efficace et sûr, le vaccin Men C-C offre la meilleure prévention contre les infections à méningocoque de type C et les complications associées. Les infections à méningocoque peuvent être très graves et peuvent être propagées par des personnes asymptomatiques. La vaccination contre les infections à méningocoque de type C assure une protection, pour vous-même et pour les autres.

Effets secondaires possibles du vaccin :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient avoir de la fièvre, éprouver de l'irritabilité ou de l'inconfort. Ces symptômes sont généralement légers et ne durent qu'un jour ou deux.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez un professionnel de la santé si les symptômes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave. Ces réactions sont rares et se traitent à la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une réaction allergique grave. Si vous développez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.