

Vaccin conjugué contre le pneumocoque

Le vaccin **conjugué contre le pneumocoque** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon pour prévenir ou atténuer les complications des infections à pneumocoque. Ce vaccin couvre 13 souches différentes de la bactérie. Les bactéries en question se propagent d'une personne à l'autre par des gouttelettes projetées dans l'air lorsque quelqu'un tousse ou éternue, ou par contact direct avec la salive. Le risque est beaucoup plus élevé lorsque vous êtes déjà porteur d'une infection virale comme l'influenza.

Les pneumocoques peuvent causer :

- Otites et sinusites
- Pneumonie
- Méningite (infection du liquide dans le cerveau/la moelle épinière)
- Infection du sang

Les complications des infections à pneumocoque peuvent entraîner :

- Surdit 
- L sions c r brales
- D c s (26 % des cas de m ningite)

Pourquoi le vaccin conjugu  contre le pneumocoque est-il recommand ?

Bon nombre de personnes expos es aux pneumocoques ne pr sentent que des sympt mes b nins, mais certaines personnes, notamment les jeunes enfants, les personnes  g es et les personnes ayant certains probl mes de sant , pourraient tomber tr s malades. Ce vaccin est tr s efficace et s r, et constitue le meilleur moyen de pr venir ou d'att nuer les complications des infections   pneumocoque. En plus des doses administr es dans le cadre du calendrier de vaccination syst matique, des doses suppl mentaires peuvent  tre administr es aux nourrissons ou aux enfants ayant certaines maladies   haut risque (ex. diab te, maladie chronique des reins ou du foie). Ces enfants, de m me que certains adultes   haut risque, pourraient plus tard avoir besoin d'une dose suppl mentaire du vaccin antipneumococcique. Consultez un professionnel de la sant  pour d terminer vos besoins.

Effets secondaires possibles de la vaccination :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient avoir de la fi vre ou des maux de t te ou  prouver de la fatigue. Ces sympt mes sont habituellement l gers et ne durent qu'un ou deux jours.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'ac taminoph ne ou de l'ibuprof ne si la fi vre atteint 38,5  C ou plus. Consultez un professionnel de la sant  si les sympt mes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester   la clinique 15 minutes apr s la vaccination dans l' ventualit  d'une r action allergique grave. Ces r actions sont rares et se traitent   la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une r action allergique grave. Si vous d veloppez une r action allergique apr s avoir quitt  la clinique, composez le 911 ou le num ro d'urgence de votre r gion.

www.yukonimmunization.ca/fr/

