

Vaccin conjugué contre le méningocoque C

Infections à méningocoque de type C

Le **vaccin conjugué contre le méningocoque C (Men C-C)** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon et protège contre les infections à méningocoque de type C et les complications qui y sont associées.

Le **méningocoque de type C** est une bactérie qui peut causer des infections mortelles, notamment une infection du cerveau ou du sang. Les infections à méningocoque se propagent facilement par la toux, les éternuements ou les contacts avec la salive d'une personne infectée. La bactérie à méningocoque peut être transmise par une personne asymptomatique.

Le **vaccin Men C-C** est administré aux enfants à l'âge de 2 mois, puis à l'âge d'un an. Les enfants ayant des troubles médicaux particuliers pourraient avoir besoin d'une dose supplémentaire à l'âge de 4 mois.

Les infections à méningocoque C peuvent causer :

- Forte fièvre
- Maux de tête sévères
- Nausées et vomissements
- Détérioration générale de l'état de santé
- Éruptions cutanées

Complications possibles :

- Lésions cérébrales permanentes
- Surdit 
- Amputation des mains ou des pieds (10 à 15 %)
- D c s (10 à 15 %)

Pourquoi recommande-t-on la vaccination contre le méningocoque de type C?

Très efficace et s r, le vaccin Men C-C offre la meilleure pr vention contre les infections   méningocoque de type C et les complications associ es. Les infections   méningocoque peuvent  tre tr s graves et peuvent  tre propag es par des personnes asymptomatiques. La vaccination contre les infections   méningocoque de type C assure une protection, pour vous-m me et pour les autres.

Effets secondaires possibles du vaccin :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient avoir de la fièvre,  prouver de l'irritabilit  ou de l'inconfort. Ces sympt mes sont g n ralement l gers et ne durent qu'un jour ou deux.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'ac taminoph ne ou de l'ibuprof ne si la fièvre atteint 38,5  C ou plus. Consultez un professionnel de la sant  si les sympt mes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester   la clinique 15 minutes apr s la vaccination dans l' ventualit  d'une r action allergique grave. Ces r actions sont rares et se traitent   la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une r action allergique grave. Si vous d veloppez une r action allergique apr s avoir quitt  la clinique, composez le 911 ou le num ro d'urgence de votre r gion.

yukonimmunization.ca/fr

Mise   jour : juillet 2021

