

Vaccin antipneumococcique

Le **vaccin antipneumococcique** est administré pour prévenir ou atténuer les complications des infections pneumococciques invasives. Ce vaccin couvre 23 souches différentes de la bactérie. Les bactéries en question se propagent d'une personne à l'autre par des gouttelettes projetées dans l'air lorsque quelqu'un tousse ou éternue, ou par contact direct avec la salive. Le risque est beaucoup plus élevé lorsque vous êtes déjà porteur d'une infection virale comme l'influenza.

Les pneumocoques peuvent causer :

- Otites et sinusites
- Pneumonie
- Méningite (infection du liquide dans le cerveau/ la moelle épinière)
- Infection du sang

Les complications des infections à pneumocoque peuvent entraîner :

- Surdit 
- L sions du cerveau
- D c s (26 % des cas de m ningite)

Pourquoi le vaccin antipneumococcique est-il recommand ?

Bon nombre de personnes expos es aux pneumocoques ne pr sentent que des sympt mes b nins, mais certaines personnes pourraient tomber tr s malades. Le vaccin est offert gratuitement aux personnes   haut risque comme : les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes d'affections chroniques (diab te, maladie du foie, du c ur, des poumons et des reins, aspl nie ou alcoolisme), les personnes immunod prim es, les fumeurs, les consommateurs de drogues illicites et les sans-abri. Les personnes atteintes de certaines maladies   haut risque pourraient avoir besoin d'une dose de rappel. Consultez un professionnel de la sant  pour d terminer vos besoins.

Effets secondaires possibles de la vaccination :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient avoir de la fi vre ou des maux de t te ou  prouver de la fatigue. Ces sympt mes sont habituellement l gers et ne durent qu'un ou deux jours.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'ac taminoph ne ou de l'ibuprof ne si la fi vre atteint 38,5  C ou plus. Consultez un professionnel de la sant  si les sympt mes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester   la clinique 15 minutes apr s la vaccination dans l' ventualit  d'une r action allergique grave. Ces r actions sont rares et se traitent   la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une r action allergique grave. Si vous d veloppez une r action allergique apr s avoir quitt  la clinique, composez le 911 ou le num ro d'urgence de votre r gion.

yukonimmunization.ca/fr

