

Calendrier de vaccination systématique des enfants

Vaccin	2 mois	4 mois	6 mois	12 mois	18 mois	4-6 ans	6 ^e année	9 ^e année
DTCa-HB-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, hépatite B, poliomyélite et <i>Haemophilus influenzae</i> de type B	✓	✓	✓					
DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite et <i>Haemophilus influenzae</i> de type B					✓			
DTCa-VPI/Tdca-VPI Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire et poliomyélite						✓		
Virus du papillome humain (VPH)							✓*	
Influenza (grippe)			✓**					
Rougeole, oreillons et rubéole (ROR)				✓		✓		
Vaccin conjugué contre le méningocoque du groupe C (Men-C-C)	✓	~		✓				
Vaccin quadrivalent contre le méningocoque (Men-ACYW-135)								✓
Vaccin conjugué contre le pneumocoque	✓	✓	~	✓				
Rotavirus	✓	✓	✓***					
Tdca Tétanos, diphtérie et coqueluche acellulaire								✓
Varicelle				✓		✓		

* Deux doses doivent être administrées à six mois d'intervalle.

** Le vaccin contre la grippe doit être administré chaque année. Les enfants de six mois à neuf ans qui sont vaccinés contre la grippe pour la première fois doivent recevoir deux doses à quatre semaines d'intervalle.

*** Pour le vaccin RotaTeq^{MD}, le calendrier régulier prévoit l'administration de 3 doses.

~ Les enfants ayant des problèmes de santé particuliers qui les exposent à un risque élevé de maladie devraient recevoir une dose additionnelle.