

# Vaccin conjugué contre le pneumocoque

Le vaccin **conjugué contre le pneumocoque** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon pour prévenir ou atténuer les complications des infections à pneumocoque. Ce vaccin couvre 13 souches différentes de la bactérie. Les bactéries en question se propagent d'une personne à l'autre par des gouttelettes projetées dans l'air lorsque quelqu'un tousse ou éternue, ou par contact direct avec la salive. Le risque est beaucoup plus élevé lorsque vous êtes déjà porteur d'une infection virale comme l'influenza.

## Les pneumocoques peuvent causer :

- Otites et sinusites
- Pneumonie
- Méningite (infection du liquide dans le cerveau/la moelle épinière)
- Infection du sang

## Les complications des infections à pneumocoque peuvent entraîner :

- Surdit 
- L sions c r brales
- D c s (26 % des cas de m ningite)

## Pourquoi le vaccin conjugu  contre le pneumocoque est-il recommand ?

Bon nombre de personnes expos es aux pneumocoques ne pr sentent que des sympt mes b nins, mais certaines personnes, notamment les jeunes enfants, les personnes âg es et les personnes ayant certains probl mes de sant , pourraient tomber tr s malades. Ce vaccin est tr s efficace et s r, et constitue le meilleur moyen de pr venir ou d'att nuer les complications des infections  pneumocoque. En plus des doses administr es dans le cadre du calendrier de vaccination syst matique, des doses suppl mentaires peuvent  tre administr es aux nourrissons ou aux enfants ayant certaines maladies  haut risque (ex. diab te, maladie chronique des reins ou du foie). Ces enfants, de m me que certains adultes  haut risque, pourraient plus tard avoir besoin d'une dose suppl mentaire du vaccin antipneumococcique. Consultez un professionnel de la sant  pour d terminer vos besoins.

## Effets secondaires possibles de la vaccination :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient avoir de la fi vre ou des maux de t te ou  prouver de la fatigue. Ces sympt mes sont habituellement l gers et ne durent qu'un ou deux jours.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'ac taminoph ne ou de l'ibuprof ne si la fi vre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez un professionnel de la sant  si les sympt mes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester  la clinique 15 minutes apr s la vaccination dans l' ventualit  d'une r action allergique grave. Ces r actions sont rares et se traitent  la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une r action allergique grave. Si vous d veloppez une r action allergique apr s avoir quitt  la clinique, composez le 911 ou le num ro d'urgence de votre r gion.

[www.yukonimmunization.ca/fr/](http://www.yukonimmunization.ca/fr/)

**Yukon**



# Vaccin antipneumococcique

Le **vaccin antipneumococcique** est administré pour prévenir ou atténuer les complications des infections pneumococciques invasives. Ce vaccin couvre 23 souches différentes de la bactérie. Les bactéries en question se propagent d'une personne à l'autre par des gouttelettes projetées dans l'air lorsque quelqu'un tousse ou éternue, ou par contact direct avec la salive. Le risque est beaucoup plus élevé lorsque vous êtes déjà porteur d'une infection virale comme l'influenza.

## Les pneumocoques peuvent causer :

- Otites et sinusites
- Pneumonie
- Méningite (infection du liquide dans le cerveau/ la moelle épinière)
- Infection du sang

## Les complications des infections à pneumocoque peuvent entraîner :

- Surdité
- Lésions du cerveau
- Décès (26 % des cas de méningite)

## Pourquoi le vaccin antipneumococcique est-il recommandé?

Bon nombre de personnes exposées aux pneumocoques ne présentent que des symptômes bénins, mais certaines personnes pourraient tomber très malades. Le vaccin est offert gratuitement aux personnes à haut risque comme : les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes d'affections chroniques (diabète, maladie du foie, du cœur, des poumons et des reins, asplénie ou alcoolisme), les personnes immunodéprimées, les fumeurs, les consommateurs de drogues illicites et les sans-abri. Les personnes atteintes de certaines maladies à haut risque pourraient avoir besoin d'une dose de rappel. Consultez un professionnel de la santé pour déterminer vos besoins.

## Effets secondaires possibles de la vaccination :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient avoir de la fièvre ou des maux de tête ou éprouver de la fatigue. Ces symptômes sont habituellement légers et ne durent qu'un ou deux jours.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez un professionnel de la santé si les symptômes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave. Ces réactions sont rares et se traitent à la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une réaction allergique grave. Si vous développez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

[www.yukonimmunization.ca/fr](http://www.yukonimmunization.ca/fr)

**Yukon**

