

Vaccin DCaT-VPI-Hib

Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite et *Hæmophilus influenzae* de type b

Le **vaccin DCaT-VPI-Hib** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon.

Le **vaccin DCaT-VPI-Hib** est un vaccin combiné administré aux enfants de 18 mois comme dose de rappel pour les enfants vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et l'*Hæmophilus influenzae* de type b.

Ce vaccin protège contre cinq maladies :

- Diphtérie
- Tétanos
- Coqueluche
- Poliomyélite
- *Hæmophilus influenzae* de type b

La **diphtérie** peut causer de graves troubles respiratoires et entraîner une insuffisance cardiaque et la paralysie.

Le **tétanos** peut causer des raideurs douloureuses dans les muscles et même la mort (dans 10 % des cas). Les conséquences peuvent être très graves si les muscles respiratoires sont affectés.

La **coqueluche** peut causer une grave toux. Elle peut entraîner une pneumonie, des lésions cardiaques, nerveuses ou cérébrales, des fractures aux côtes, des convulsions et même la mort.

La **poliomyélite** est une infection virale qui s'attaque au système nerveux et qui peut entraîner la paralysie totale en quelques heures seulement.

L'***Hæmophilus Influenzæ* de type b (Hib)** peut causer des infections bénignes à mortelles dans différentes parties du corps.

Pourquoi recommande-t-on le vaccin DCaT-VPI-Hib?

Le vaccin DCaT-VPI-Hib est très efficace et sans danger. Il s'agit de la meilleure protection, pour vous et les autres, contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et l'*Hæmophilus influenzae* de type b.

Une dose de rappel est essentielle pour assurer une protection complète contre ces maladies. Il est très important de recevoir le vaccin selon le calendrier prévu. Sans cette dose de rappel, votre corps ne sera pas en mesure de continuer à assurer votre protection et celle des autres contre ces maladies.

Effets secondaires possibles du vaccin :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient avoir de la fièvre, éprouver de l'irritabilité, de la fatigue ou des problèmes digestifs. Ces symptômes sont généralement légers et ne durent qu'un jour ou deux.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez un professionnel de la santé si les symptômes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave. Ces réactions sont rares et se traitent à la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une réaction allergique grave. Si vous développez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

yukonimmunization.ca/fr

