

Vaccin contre le rotavirus

Rotavirus

Le **vaccin contre le rotavirus** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon. Le **rotavirus** est une infection très répandue qui provoque de graves diarrhées et vomissements chez les nourrissons et les jeunes enfants. Près de 95% des enfants auront au moins une infection à rotavirus avant l'âge de 5 ans. Le virus se propage facilement par contact direct avec des personnes infectées ou par contact avec des objets ou des aliments contaminés. Cela comprend le contact avec les selles d'un enfant infecté, par exemple lors des changements de couches.

Pour obtenir une protection complète, il est nécessaire d'administrer trois doses du **vaccin contre le rotavirus** à l'âge de 2 mois, de 4 mois et de 6 mois. Il est très important de recevoir les vaccins selon le calendrier prévu.

Les infections au rotavirus peuvent causer:

- Fièvre
- Vomissements
- Douleurs abdominales

Complications possibles:

- Déshydratation
- Soins d'urgence ou hospitalisation pour traiter la déshydratation, qui peut nécessiter l'administration de liquide par voie intraveineuse
- Maladie prolongée et plus grave chez les enfants dont le système immunitaire est affaibli

Pourquoi recommande-t-on la vaccination contre le rotavirus?

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre cette infection et ses complications. Le vaccin ne s'injecte pas, il est administré par voie orale, au moyen de quelques gouttes de liquide. Le vaccin contre le rotavirus est très efficace et sûr. La plupart des bébés n'ont pas d'effets secondaires après la vaccination. La vaccination de votre enfant contre le rotavirus contribue également à protéger les autres.

Effets secondaires possibles du vaccin:

La plupart des bébés n'ont aucun effet secondaire après la vaccination. Certaines personnes pourraient avoir de la fièvre, éprouver de l'irritabilité, de la fatigue ou des troubles digestifs. Ces symptômes sont généralement légers et ne durent qu'un jour ou deux. Il y a une légère augmentation du risque d'invagination intestinale dans 1 à 7 cas sur 100 000 doses dans les 7 jours suivant la première et la deuxième dose.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, on peut donner de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez un médecin en cas de pleurs incessants ou si votre enfant présente un gonflement de l'estomac, des vomissements fréquents ou du sang dans les selles.

Il est important de rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave. Ces réactions sont rares et se traitent à la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une réaction allergique grave. Si vous développez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

yukonimmunization.ca/fr

