

Vaccin RROV

Rougeole, rubéole, oreillons et varicelle

Le **vaccin RROV** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon et protège contre quatre maladies : la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle.

Le **vaccin RROV** est une combinaison de quatre vaccins en un. Il est administré en deux doses; votre enfant devrait avoir reçu la première dose à l'âge de 1 an. La seconde dose est offerte aux enfants avant leur entrée à l'école (entre 4 et 6 ans).

Ce vaccin protège contre quatre maladies :

- Rougeole
- Rubéole
- Oreillons
- Varicelle

La rougeole peut provoquer de la fièvre, un écoulement nasal, une rougeur des yeux et des éruptions cutanées sur le visage et le corps. Elle peut causer des infections aux oreilles, une pneumonie ou une infection du cerveau. Les complications plus graves comprennent les crises d'épilepsie, la perte d'audition, les lésions cérébrales permanentes et même la mort.

La rubéole peut causer de la fièvre, et parfois, l'enflure des ganglions et des douleurs articulaires. Chez la femme enceinte, l'infection peut causer de multiples anomalies congénitales chez le bébé.

Les oreillons peuvent provoquer de la fièvre, des maux de tête et une enflure des glandes salivaires qui fait gonfler les joues. Les complications possibles comprennent l'inflammation du cerveau, l'inflammation temporaire et douloureuse des testicules ou des ovaires et la perte d'audition.

La varicelle peut causer de la fièvre et des éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons. Les complications possibles comprennent la pneumonie, les infections cutanées, l'inflammation du cerveau et la mort. Chez la femme enceinte, l'infection peut causer de multiples anomalies congénitales chez le bébé.

Pourquoi recommande-t-on le vaccin RROV?

Ce vaccin est le meilleur moyen de protéger votre enfant contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle.

La vaccination de votre enfant contribue également à protéger les autres.

Effets secondaires possibles du vaccin

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. De la fièvre ou une éruption cutanée pourrait se manifester de 6 à 23 jours après la vaccination.

Pour soulager facilement les effets secondaires, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez un professionnel de la santé si les symptômes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave. Ces réactions sont extrêmement rares (moins de 1 cas sur 1 million) et se traitent à la clinique. Si une réaction allergique se déclare après que vous avez quitté la clinique, composez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

yukonimmunization.ca/fr

