

Vaccin Hib

Hæmophilus influenzae de type b (Hib)

Le vaccin Hib fait partie du calendrier de vaccination systématique du Yukon.

Qu'est-ce que Hib?

Hæmophilus influenzae de type b, ou simplement Hib, est une bactérie pouvant provoquer une méningite, qui est une infection des membranes autour du cerveau et de la moelle épinière. Elle peut également entraîner des infections du sang. Ces complications peuvent mener à des handicaps permanents (ex. perte auditive ou retards de développement) ou au décès. Hib se transmet par les gouttelettes projetées lorsqu'une personne tousse ou éternue.

Qu'est-ce que le vaccin Hib?

Le vaccin Hib est un vaccin conjugué qui protège contre *Hæmophilus influenzae* de type b. Il induit le système immunitaire à produire des anticorps contre cette bactérie.

Pourquoi recommande-t-on le vaccin?

Avant son ajout au programme de vaccination systématique, Hib était l'une des principales causes de méningite chez les enfants en bas âge au Canada.

Le vaccin contribue donc à la protection contre les infections graves et potentiellement mortelles causées par cette bactérie.

La vaccination systématique a permis de réduire considérablement les cas de Hib au Canada. Elle est le meilleur moyen de protéger la population et de prévenir la propagation de Hib.

Qui devrait recevoir le vaccin Hib?

Le vaccin Hib fait partie du calendrier de vaccination systématique destiné à tous les nourrissons et enfants en bas âge. Il est généralement administré par un vaccin combiné appelé INFANRIX hexa.

Il est également recommandé aux personnes présentant un risque accru d'infection invasive due à Hib, notamment celles qui :

- ont des implants cochléaires;
- ont reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques;
- ont reçu greffe d'organe entier;
- sont atteintes d'asplénie, dont la drépanocytose;
- sont atteintes d'autres troubles de la santé qui affaiblissent le système immunitaire en raison d'une maladie ou d'un traitement.

Si vous ne savez pas si vous ou votre enfant devez vous faire vacciner, parlez-en à un professionnel de la santé ou aux spécialistes de votre centre de santé local.

Réactions possibles au vaccin

Les réactions suivantes sont les plus courantes après la vaccination. Elles sont généralement bénignes et durent un ou deux jours.

- Rougeur, sensibilité ou enflure au point d'injection
- Fièvre légère
- Maux de tête
- Fatigue
- Symptômes digestifs

Les effets secondaires se traitent généralement facilement. Vous pouvez appliquer une compresse froide et humide au point d'injection. Au besoin, prenez un analgésique (ex. acétaminophène). Si les symptômes sont graves ou durent plus de 48 heures, consultez un professionnel de la santé.

Après l'administration du vaccin

- Après avoir reçu le vaccin, restez à la clinique pendant 15 minutes.
- Les réactions allergiques graves sont très rares. Le personnel de la clinique est formé pour les traiter sur-le-champ.
- Si les symptômes d'une telle réaction se déclarent après votre départ de la clinique, appelez immédiatement le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.