

Vaccin inactivé contre la poliomyélite (VPI)

Le vaccin inactivé contre la poliomyélite, également appelé VPI, fait partie du calendrier de vaccination systématique du Yukon

Qu'est-ce que la poliomyélite?

La poliomyélite, également appelée « polio », est causée par le poliovirus.

La poliomyélite se transmet par contact avec les selles d'une personne infectée. Elle peut également se propager par l'eau ou des aliments contaminés.

La plupart des personnes qui contractent la poliomyélite ne présentent aucun symptôme ou ne développent qu'une forme bénigne de la maladie. Cependant, dans certains cas, le virus peut toucher le système nerveux et entraîner une paralysie définitive, particulièrement des jambes.

Grâce à la vaccination, la poliomyélite a été éradiquée au Canada, mais elle circule toujours dans certains pays. C'est pourquoi il est important de maintenir ses vaccins à jour.

Qu'est-ce que le VPI?

- Le VPI est un vaccin inactivé. Il ne contient donc pas de virus actif.
- Le vaccin protège contre la poliomyélite en aidant le système immunitaire à produire des anticorps contre le poliovirus. Ces anticorps contribueront à votre protection en cas d'exposition au virus.

Pourquoi recommande-t-on le vaccin?

- Le vaccin contre la poliomyélite est très efficace.
- Il permet de prévenir les complications graves de la maladie, notamment la paralysie, la méningite et l'invalidité de longue durée.

Qui devrait recevoir le vaccin?

- Le vaccin contre la poliomyélite fait partie du calendrier de vaccination systématique des nourrissons et des enfants.
- Le VPI est généralement administré en dose de rappel aux enfants plus âgés, aux adolescents et aux adultes qui ne sont pas entièrement vaccinés.
- Si vous ne savez pas si vous ou votre enfant devez vous faire vacciner, parlez-en à un professionnel de la santé ou aux spécialistes de votre centre de santé local.

Réactions possibles au vaccin

Les réactions suivantes sont les plus courantes après la vaccination. Elles sont généralement bénignes et durent un ou deux jours.

- Rougeur, sensibilité ou enflure au point d'injection
- Fièvre légère
- Maux de tête
- Fatigue
- Symptômes digestifs

Les effets secondaires se traitent généralement facilement. Vous pouvez appliquer une compresse froide et humide au point d'injection. Au besoin, prenez un analgésique (ex. acétaminophène). Si les symptômes sont graves ou durent plus de 48 heures, consultez un professionnel de la santé.

Après l'administration du vaccin

Après avoir reçu le vaccin, restez à la clinique pendant 15 minutes.

Les réactions allergiques graves sont très rares. Le personnel de la clinique est formé pour les traiter sur-le-champ.

Si les symptômes d'une telle réaction se déclarent après votre départ de la clinique, appelez immédiatement le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.