

Vaccin RROV

Rougeole, rubéole, oreillons et varicelle

Le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle (RROV) fait partie du calendrier de vaccination systématique des enfants au Yukon.

Qu'est-ce que la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle?

- **La rougeole** est une infection virale très contagieuse. Elle se transmet par les gouttelettes projetées lorsqu'une personne tousse ou éternue. La rougeole peut provoquer de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et une éruption cutanée, et peut entraîner de graves complications, notamment une pneumonie, un œdème cérébral ou la mort, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes au système immunitaire affaibli.
- **La rubéole** est une infection virale qui se transmet par les gouttelettes respiratoires. Elle provoque généralement une légère fièvre, une éruption cutanée et un gonflement des ganglions lymphatiques. La rubéole peut avoir des conséquences très graves pendant la grossesse, car elle peut entraîner une fausse couche, la mortinatalité ou de graves malformations congénitales, regroupées sous le nom de « embryopathie rubéolique », qui comprend notamment des malformations cardiaques, la surdité et des retards de développement.
- **Les oreillons** sont une infection virale qui touche principalement les glandes salivaires. Ils peuvent provoquer un gonflement douloureux au niveau de la mâchoire et des joues. Entre autres complications possibles, citons la méningite, une perte auditive, un gonflement des testicules ou des ovaires et, dans de rares cas, une encéphalite.
- **La varicelle (picote)** est une infection virale contagieuse causée par le virus varicelle-zona. Elle se transmet par les gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec le liquide contenu dans ses vésicules qui démangent. Les symptômes comprennent généralement de la fièvre, de la fatigue et une éruption cutanée qui se transforme en petites vésicules remplies de liquide. La plupart des enfants s'en remettent sans problème, mais la varicelle peut parfois entraîner des infections cutanées, une pneumonie ou une encéphalite.

Qu'est-ce que le vaccin RROV?

Il s'agit d'un vaccin vivant combiné et atténué qui protège contre quatre infections virales graves et très contagieuses : la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle. Il induit le système immunitaire à produire des anticorps contre ces maladies.

Qui devrait recevoir le vaccin?

Les enfants âgés de quatre à six ans reçoivent ce vaccin afin de compléter leur série vaccinale contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle.

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin?

Vous ne devez pas recevoir le vaccin RROV si vous avez déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à un composant du vaccin. Si le système immunitaire de votre enfant est très affaibli, par exemple à la suite d'un traitement contre le cancer, parlez-en d'abord à votre prestataire de soins de santé.

Réactions possibles au vaccin

Les réactions courantes après la vaccination incluent une douleur, une rougeur et une enflure au point d'injection. Une fièvre légère et une éruption cutanée semblable à celle de la rougeole ou de la varicelle peuvent apparaître environ deux semaines après la vaccination.

Les effets secondaires se traitent généralement facilement. Vous pouvez appliquer une compresse froide et humide au point d'injection. Au besoin, prenez un analgésique (ex. acétaminophène). Si les symptômes sont graves ou durent plus de 48 heures, consultez un professionnel de la santé.

Après l'administration du vaccin

- Après avoir reçu le vaccin, restez à la clinique pendant 15 minutes.
- Les réactions allergiques graves sont très rares. Le personnel de la clinique est formé pour les traiter sur-le-champ.
- Si les symptômes d'une telle réaction se déclarent après votre départ de la clinique, appelez immédiatement le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

Pourquoi recommande-t-on les vaccins RROV?

Deux doses du vaccin RROV offrent une protection très élevée contre ces maladies. Par exemple, deux doses de vaccin contre la rougeole ont une efficacité d'environ 97 %, et deux doses de vaccin contre la varicelle sont très efficaces pour prévenir les formes modérées à graves de la maladie.

Le vaccin combiné RROV est sûr, a fait l'objet de nombreuses études et constitue l'un des moyens les plus efficaces de prévenir ces infections. La vaccination de votre enfant permet non seulement de le protéger, mais aussi de protéger les autres membres de votre communauté, en particulier ceux et celles qui ne peuvent pas se faire vacciner ou qui sont plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie.