

Vaccin contre le rotavirus

Le vaccin contre le rotavirus fait partie du calendrier de vaccination systématique des nourrissons au Yukon.

Qu'est-ce que le rotavirus?

Le rotavirus est une infection virale très répandue qui provoque de graves diarrhées et vomissements chez les nourrissons et les jeunes enfants. Presque tous les enfants auront au moins une infection à rotavirus avant l'âge de 5 ans. Le virus se propage facilement par contact direct avec des personnes infectées ou par contact avec des objets ou des aliments contaminés, et aussi par le contact avec les selles d'un enfant infecté (ex. durant un changement de couches). Les infections à rotavirus peuvent provoquer de la fièvre, des vomissements, des douleurs abdominales et une diarrhée grave. Parmi les complications possibles, on compte la déshydratation, qui peut nécessiter des soins d'urgence ou une hospitalisation pour une réhydratation par voie intraveineuse.

Qu'est-ce que le vaccin contre le rotavirus?

Le vaccin contribue à la protection des jeunes enfants contre le rotavirus.

Il est administré par voie orale, et non par injection.

Il s'agit d'un vaccin vivant atténué, c'est-à-dire qu'une version affaiblie du virus est administrée pour renforcer le système immunitaire de l'enfant.

Pourquoi recommande-t-on le vaccin?

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre le rotavirus et ses complications. Elle contribue en plus à la protection des autres. Le vaccin est sûr et très efficace. La plupart des bébés n'ont pas d'effets secondaires après la vaccination.

Qui devrait recevoir le vaccin?

Les nourrissons, selon le calendrier de vaccination systématique.

Réactions possibles au vaccin

La plupart des bébés n'ont aucune réaction après la vaccination, bien que les symptômes suivants puissent se manifester :

- fièvre légère;
- irritabilité;
- fatigue;
- troubles gastriques légers.

Ces symptômes sont généralement légers et disparaissent d'eux-mêmes.

Le risque d'invagination intestinale (obstruction de l'intestin) est légèrement accru après la vaccination, particulièrement dans la première semaine suivant la vaccination.

Consultez immédiatement un médecin si votre bébé a :

- des pleurs intenses;
- le ventre enflé;
- des vomissements répétés;
- du sang dans ses selles;
- une faiblesse ou une fatigue inexplicables.

Après l'administration du vaccin

- Après avoir reçu le vaccin, l'enfant devrait rester à la clinique pendant 15 minutes.
- Les réactions allergiques graves sont très rares. Le personnel de la clinique est formé pour les traiter sur-le-champ.
- Si les symptômes d'une telle réaction se déclarent après votre départ de la clinique, appelez immédiatement le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

Pour en savoir plus :
yukonimmunization.ca/fr

