

Calendrier de vaccination systématique des enfants

Vaccin	Naissance	2 mois	4 mois	6 mois	12 mois	18 mois	4 à 6 ans	6e année	9e année
DCaT-VPI-Hib-HB Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite, Haemophilus influenzae de type b et hépatite B		✓	✓	✓					
DCaT-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite et Haemophilus influenzae de type b						✓			
dcaT-VPI Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire et poliomyélite							✓		
Virus du papillome humain (VPH)								✓	
Rougeole, oreillons et rubéole (ROR)					✓		✓ +		
Vaccin méningococcique quadrivalent (Men-C-ACYW-135)		~	~		✓				✓
Vaccin conjugué contre le pneumocoque		✓	✓	~	✓				
Rotavirus		✓	✓	✓					
dcaT Diphtérie, tétanos et coqueluche acellulaire									✓
Varicelle					✓		✓ +		
Vaccinations saisonnières									
Virus respiratoire syncytial (VRS)	✓ *								
Influenza (grippe)				✓ **					
COVID-19				✓ ***					

* Nourrissons âgés de moins de 9 mois au début de la saison du VRS (généralement de novembre à avril)

** Les nourrissons âgés de 6 mois à 8 ans inclusivement qui n'ont jamais reçu de vaccin contre l'influenza au cours d'une saison précédente doivent recevoir une série de 2 doses.

*** Les nourrissons âgés de 6 mois et plus devraient recevoir 1 dose par année. Les enfants présentant un risque médical accru pourraient être admissibles à une dose supplémentaire.

~ Les enfants présentant un risque médical accru pourraient être admissibles à des vaccinations supplémentaires.

+ La 2e dose du vaccin peut être administrée sous forme de vaccin combiné (RORV).