

Vaccin contre la COVID-19

SRAS-CoV-2

Le vaccin contre la **COVID-19** fait partie du Programme yukonnais de vaccination.

Qu'est-ce que le SARS-CoV-2 (COVID-19)?

Le SRAS-CoV-2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2) est le virus respiratoire à l'origine de la COVID-19. Il se transmet facilement d'une personne à l'autre par les moyens suivants :

- L'inhalation de gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une personne tousse, éternue, parle, chante ou se trouve en contact étroit avec quelqu'un d'autre
- Le contact avec une surface contaminée, si l'on porte ensuite les mains à ses yeux, à sa bouche ou à son nez sans les avoir lavées

Le SRAS-CoV-2 peut infecter les gens, peu importe leur âge, mais les personnes âgées et celles qui sont atteintes d'une maladie chronique sont davantage à risque de développer une forme grave de la maladie.

Symptômes de la COVID-19

- Fièvre et frissons
- Fatigue
- Toux ou essoufflement
- Douleurs musculaires ou articulaires
- Mal de gorge
- Mal de tête
- Perte du goût ou de l'odorat
- Troubles digestifs ou diarrhée

Pourquoi recommande-t-on le vaccin contre la COVID-19?

- Le vaccin contribue à réduire le risque de développer une forme grave de la maladie et des complications.
- Le vaccin est sûr et étroitement surveillé au Canada et partout dans le monde.
- C'est la meilleure protection contre l'hospitalisation, les complications à long terme et le décès à la suite d'une infection à SRAS-CoV-2.
- Il peut également contribuer à protéger les personnes qui vous entourent, notamment celles qui présentent un risque plus élevé de maladie grave, en réduisant votre risque d'infection.

Complications possibles de la COVID-19

- Syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C)
- Syndrome post-COVID-19
- Hospitalisation et décès

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin contre la COVID-19?

Les réactions courantes comprennent une rougeur, une sensibilité ou une enflure au point d'injection. Certaines personnes ont une fièvre légère, des maux de tête ou des symptômes digestifs, ou ressentent de la fatigue. Les réactions sont généralement légères et ne durent qu'un jour ou deux.

Les effets secondaires se traitent généralement facilement. Vous pouvez appliquer une compresse d'eau froide au point d'injection. Au besoin, prenez un analgésique comme de l'acétaminophène (Tylenol), selon les recommandations de votre professionnel de la santé. Si les symptômes sont graves ou durent plus de 48 heures, consultez votre professionnel de la santé.

Après l'administration du vaccin

- Restez à la clinique pendant 15 minutes.
- Les réactions allergiques graves sont très rares. Le personnel sur place est formé pour les traiter sur-le-champ. Si vous développez des signes de réaction allergique grave après votre départ, appelez immédiatement le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.