

Calendrier de vaccination des enfants

VACCINS											
ÂGE	DCaT-HB-VPI-Hib (vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l'hépatite B, la poliomyélite et Hæmophilus influenzae de type b)	DCaT-VPI-Hib (vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et Hæmophilus influenzae de type b)	DCaT-VPI (vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite)	Rota (vaccin contre le rotavirus)	Pneu-C (vaccin conjugué contre le pneumocoque)	Men-C (vaccin conjugué contre le méningocoque)	RRO (vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons)	Var (vaccin contre la varicelle)	VPH (vaccin contre les virus du papillome humain)	dcaT (vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos)	Inf (vaccin contre l'influenza)
2 mois	✓			✓	✓	✓					
4 mois	✓			✓	✓	~					
6 mois	✓			✓ ^	~						✓*
12 mois					✓	✓	✓	✓			
18 mois		✓									
4-6 ans			✓				✓	✓			
6 ^e année	Généralement administré à l'école								✓**		
9 ^e année	Généralement administré à l'école					✓***				✓	

Mai 2018

- ^ Pour le vaccin RotaTaqMD, le calendrier régulier prévoit l'administration de 3 doses.
- ~ Les enfants ayant des troubles de santé particuliers qui les exposent à un risque élevé de maladie doivent recevoir une dose supplémentaire.
- * De six mois à neuf ans : une seconde dose est nécessaire après 4 semaines, si votre enfant reçoit le vaccin pour la première fois.
- ** Série de deux doses : la seconde doit être administrée six mois après la première.
- *** Vaccin quadrivalent contre le méningocoque des sérogroupes A, C, Y, W-135.

Effets indésirables associés à la vaccination : sensibilité accrue et rougeurs au site d'injection, humeur maussade ou légère fièvre. Si votre enfant présente des symptômes plus graves, consultez votre médecin et signalez toute réaction grave au personnel infirmier du Centre de santé de votre localité. Pour de plus amples renseignements, contactez votre centre de santé de proximité.

www.yukonimmunization.ca/fr



Yukon