

## Calendrier de vaccination systématique des enfants

Vaccin	2 mois	4 mois	6 mois	12 mois	18 mois	4-6 ans	6 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année
<b>DTCa-HB-VPI-Hib</b> Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, hépatite B, poliomyélite et <i>Haemophilus influenzae</i> de type B	✓	✓	✓					
<b>DTCa-VPI-Hib</b> Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite et <i>Haemophilus influenzae</i> de type B					✓			
<b>DTCa-VPI/Tdca-VPI</b> Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire et poliomyélite						✓		
<b>Virus du papillome humain (VPH)</b>							✓*	
<b>Influenza (grippe)</b>			✓**					
<b>Rougeole, oreillons et rubéole (ROR)</b>				✓		✓		
<b>Vaccin conjugué contre le méningocoque du groupe C (Men-C-C)</b>	✓	~		✓				
<b>Vaccin quadrivalent contre le méningocoque (Men-ACYW-135)</b>								✓
<b>Vaccin conjugué contre le pneumocoque</b>	✓	✓	~	✓				
<b>Rotavirus</b>	✓	✓	✓***					
<b>Tdca</b> Tétanos, diphtérie et coqueluche acellulaire								✓
<b>Varicelle</b>				✓		✓		

\* Deux doses doivent être administrées à six mois d'intervalle.

\*\* Le vaccin contre la grippe doit être administré chaque année. Les enfants de six mois à neuf ans qui sont vaccinés contre la grippe pour la première fois doivent recevoir deux doses à quatre semaines d'intervalle.

\*\*\* Pour le vaccin RotaTeq<sup>MD</sup>, le calendrier régulier prévoit l'administration de 3 doses.

~ Les enfants ayant des problèmes de santé particuliers qui les exposent à un risque élevé de maladie devraient recevoir une dose additionnelle.