

Vaccin RROV

Rougeole, rubéole, oreillons et varicelle

Le **vaccin RROV** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon. Cette vaccination constitue le meilleur moyen de protéger votre enfant contre quatre maladies : la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle.

Le **vaccin RROV** est une combinaison de quatre vaccins administrés en une seule injection. Le **vaccin RROV** est donné en deux doses; votre enfant devrait avoir reçu la première dose à l'âge de 1 an. La seconde dose est offerte aux enfants avant leur entrée à l'école (entre 4 et 6 ans).

Ce vaccin protège contre quatre maladies :

- Rougeole
- Oreillons
- Rubéole
- Varicelle

La **rougeole** peut causer de la fièvre, des écoulements nasaux, une rougeur des yeux et une éruption cutanée sur le visage ou le corps. La rougeole peut provoquer des otites, une pneumonie ou des infections du cerveau. Parmi les complications, signalons les convulsions, la surdité, les lésions cérébrales permanentes, voire la mort.

Les **oreillons** peuvent causer de la fièvre, des maux de tête et l'inflammation des glandes salivaires, ce qui fait gonfler les joues. Parmi les complications, signalons l'inflammation du cerveau, l'inflammation temporaire mais douloureuse des testicules ou des ovaires et la surdité.

La **rubéole** peut provoquer de la fièvre et, parfois, une éruption cutanée, l'inflammation des glandes du cou et les douleurs articulaires. Le fœtus d'une femme enceinte infectée pourrait présenter de multiples anomalies congénitales.

La **varicelle** peut causer de la fièvre et une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons. Parmi les complications, signalons la pneumonie, les infections cutanées, l'inflammation du cerveau et la mort. Le fœtus d'une femme enceinte infectée pourrait présenter de multiples anomalies congénitales.

Pourquoi le vaccin RROV est-il recommandé?

Cette vaccination constitue le meilleur moyen de protéger votre enfant contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle.

Le vaccin protège votre enfant et les autres.

Effets secondaires possibles du vaccin :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Il peut y avoir apparition de fièvre ou d'une éruption cutanée de 6 à 23 jours après la vaccination.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez votre fournisseur de soins de santé si les symptômes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave. Ces réactions sont rares et se traitent à la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une réaction allergique grave. Si vous développez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.

www.yukonimmunization.ca/fr/

