

# Vaccin Td-VPI

## Tétanos, diphtérie, coqueluche et polio

Le **vaccin Td-VPI** figure au calendrier de vaccination systématique des enfants du Yukon.

Le **vaccin Td-VPI** est un vaccin combiné administré aux enfants avant leur entrée à l'école (entre 4 et 6 ans) comme dose de rappel contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la polio.

### Ce vaccin protège contre quatre maladies :

- Tétanos
- Diphtérie
- Coqueluche
- Polio

Le **tétanos** peut causer des raideurs douloureuses dans les muscles et même la mort (dans 10 % des cas). Les conséquences peuvent être très graves si les muscles respiratoires sont affectés.

La **diphtérie** peut causer de graves troubles respiratoires, et peut entraîner l'arrêt cardiaque et la paralysie.

La **coqueluche** peut causer une grave toux. Elle peut entraîner une pneumonie, des lésions cardiaques, nerveuses ou cérébrales, des fractures aux côtes, des convulsions et même la mort.

La **polio** est une infection virale qui s'attaque au système nerveux et qui peut entraîner la paralysie totale en quelques heures seulement.

### Pourquoi le vaccin Td-VPI est-il recommandé?

Le vaccin Td-VPI est efficace et sans danger. Il s'agit de la meilleure protection, pour vous et les autres, contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la polio.

Une dose de rappel est essentielle pour assurer une protection complète contre ces maladies. Il est très important de recevoir le vaccin selon le calendrier prévu. En l'absence d'une dose de rappel, l'effet protecteur finit par s'estomper.

### Effets secondaires possibles du vaccin :

Il est possible qu'une rougeur, une douleur ou une enflure apparaissent au point d'injection. Certaines personnes pourraient développer une fièvre, des maux de tête, de la fatigue ou des problèmes digestifs. Ces symptômes sont habituellement légers et ne durent qu'un jour ou deux.

Pour soulager facilement les effets secondaires de la vaccination, appliquez une compresse d'eau froide au point d'injection et prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène si la fièvre atteint 38,5 °C ou plus. Consultez votre fournisseur de soins de santé si les symptômes sont graves ou persistent plus de 48 heures.

Il est important de rester à la clinique 15 minutes après la vaccination dans l'éventualité d'une réaction allergique grave. Ces réactions sont rares et se traitent à la clinique. Moins d'une personne sur un million aura une réaction allergique grave. Si vous développez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, composez le 911 ou le numéro d'urgence de votre région.