

Vaccin conjugué contre le méningocoque C (Men C-C)

Le vaccin Men C-C est offert dans le cadre du programme yukonnais de vaccination de routine. Ce vaccin protège contre les infections à méningocoque de type C et les complications qui y sont associées.

Le vaccin est administré aux enfants à l'âge de deux mois, puis à l'âge de un an, conformément au calendrier yukonnais de vaccination des enfants.

Les infections à méningocoque C causent :

- Forte fièvre
- Maux de tête sévères
- Nausées et vomissements
- Détérioration générale de l'état de santé
- Éruptions cutanées

Les infections peuvent entraîner les complications suivantes :

- Lésions cérébrales permanentes
- Surdit 
- Amputation des mains ou des pieds (10 à 15 %)
- D c s (10 à 15 %)

Pourquoi la vaccination contre le m ningocoque de type C est-elle recommand e?

Le m ningocoque de type C est une bact rie (microbe) qui peut causer des infections tr s graves, voire mortelles, notamment la m ningite (une infection de la membrane c r brale) et la septic mie (une infection sanguine).

Les infections   m ningocoque se propagent facilement d'une personne   l'autre par la toux, les  ternuements et les contacts rapproch s face   face. La bact rie peut  tre pr sente dans les voies nasales ou la gorge d'enfants, d'adolescents ou d'adultes en sant .

La vaccination constitue le meilleur moyen de pr venir les infections   m ningocoque de type C. Le vaccin Men C-C est tr s efficace et pratiquement sans danger. Dans la plupart des cas, il n'occasionne aucun effet ind sirable. Les complications possibles d'une  ventuelle infection sont beaucoup plus s rieuses que les effets secondaires potentiels du vaccin.

Effets secondaires possibles du vaccin :

- Rougeur ou sensibilit  accrue au point d'injection (dans les 72 heures suivant la vaccination).
- (Rarement) Fi vre, irritabilit , sensation de malaise.

Des r actions allergiques se produisent tr s rarement et elles peuvent  tre trait es par la personne qui administre le vaccin. On vous demandera de rester sur place au moins 15 minutes apr s avoir re u votre vaccin de sorte que la r action allergique puisse  tre trait e, si elle se produit.

www.yukonimmunization.ca

Quoi faire :

- Un peu de r confort peut suffire.
- Appliquer des compresses froides et humides sur le point d'injection.
- Prendre de l'ac taminoph ne (ou un autre m dicament semblable) si la temp rature orale est de 38,5  C ou plus.

